

PERCORSO:

Curve da carico di glucosio (OGTT) – Centro Prelievi BT o BR

| Esame | Tipo di raccolta | Note |
|---|---|---|
| Test da carico orale di glucosio (OGTT), con eventuale curva di insulina e/o C Peptide | <u>TEMPO COMPLESSIVO DI PERMANENZA:</u> 3 ore | Preparazione al test <ul style="list-style-type: none">- è necessario un periodo di digiuno compreso fra 8 a 14 ore prima della somministrazione del glucosio;- può essere assunta una modica quantità di acqua;- nei tre giorni precedenti, il paziente non deve svolgere attività fisica intensa e assumere una dieta normale;- ogni terapia che influenzi il metabolismo glucidico deve essere, se possibile, interrotta (dopo aver consultato il medico curante);- il paziente non deve fumare il mattino del test e non devono essere in atto processi infiammatori acuti. In gravidanza <ul style="list-style-type: none">- test richiesto prima della 24° settimana: la paziente presenta fattori di rischio e normalmente il test è eseguito tra la 16° e la 18° settimana. Secondo le Linee Guida, se negativo, il test dovrebbe essere ripetuto tra la 24° e la 28° settimana;- test tra la 24° e la 28° settimana: secondo le Linee guida SID-AMD, Roma 27.03.2010, il test si esegue nelle donne gravide, nelle quali non sia stata riscontrata precedentemente una intolleranza ai carboidrati;- controllo post gravidanza: uguale alla curva da carico dell'adulto. Viene sconsigliato di allattare o accudire il bambino durante l'esecuzione del test. |